

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

ACRONYME	Phase	Organe	NéoAdj / Chir / Adj / M+	Ligne	Cancer	Statut génomique	Shéma rapide	Centres
FFCD 1302 FFCD 1302	2	Cancer colorectal métastatique	-	-	Cancer colorectal métastatique	-	Drug: FOLFIR + Afibercept injection of FOLFIRI and Afibercept every 14 days until progression of disease	CHU ANGERS/
GDX-44-008 GDX-44-008	2-3	carcinome hepato cellulaire	-	-	carcinome hepato cellulaire	-	Drug: P03277 P03277 will be administered at 0.1 mmol/kg BW (corresponding to 0.2 mL/kg BW) by intravenous (IV) bolus injection at 2 mL/s rate without dilution, followed by a 0.9% saline flush	CHU ANGERS/
POLAR-M PP06490 NCT03654729	3	Colon	-	-	Cancer du côlon	-	Drug: Calmangafodipir (2 µmol/kg) Drug: Calmangafodipir (5 µmol/kg) Drug: Placebo	Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/
PRODIGE22 ECKINOXE	2	colon	1-néoadjuvant 2-chirurgie	1ère ligne	cancer colique localement avancé	-	FOLFOX-4 (4 cycles) – TDM, Colectomie, FOLFOX-4 (8 cycles) vs FOLFOX-4 + Cetuximab (4 cycles) – TDM, Colectomie, FOLFOX-4 + Cetuximab (8 cycles) vs Colectomie, FOLFOX-4 (12 cycles)	Brest CHU (URC)/
LEANOX ICM-URC2016/27 PRODIGE LEANOX	2	colon	3-adjuvant	-	CRC stade III	Has undergone a curative resection for stage III colon cancer.	Active Comparator: Folfox 4 Experimental: Folfox 4 LBM	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/Rennes CEM/Brest Clinique Pasteur/St Malo CH/
ASPIK Prodige 50 - Prodige-50	3	colon	4-maintenance	-	Adénocarcinome du colon stade II, III	PIK3 exon 9 ou exon 20 (Plateforme centralisée) Mutation RAS présence versus absence	Chimiothérapie avec oxaliplatine (FOLFOX-XELOX) versus sans oxaliplatine (5FU seul ou pas de chimiothérapie)	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/St Malo Clinique de la Côte d'Emeraude/Quimper CH/Morlaix CH/St Malo CH/
OPTIPRIME FFCD 1605 NCT03584711	2	COLON	5- localement avancé ou métastatique	1ère ligne	adénocarcinome colo-rectal	pas de mutation	Combination Product: FOLFOX + panitumumab FOLFOX + panitumumab according to a "stop and go" strategy with a reintroduction loop after progression on fluoropyrimidine as maintenance treatment	Saint Grégoire CHP/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PRODIGE30 CLIMAT	3	colon	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Cancer colique	-	Chir + chimio +/-biothérapie vs Chimio +/-biothérapie	Rennes CHU (CIC)/Vannes CHBA/
FFCD 1404 REGOLD, REGOLD- FFCD 1404	2	colon	5-localement avancé ou métastatique	toutes lignes	adénocarcinome	-	Régorafenib, comprimés	Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/CHU ANGERS/
ANCHOR-CRC NCT03693170 W00090 GE 2 01 ANCHOR	2	Colon	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Cancer colorectal	BRAFV600E Mutant	Drug: encorafenib Drug: Binimetinib Drug: Cetuximab	Brest CHU (URC)/
IROCAS UC- 0110/1609_PRODIGE 52/UCG129 prodige 52	3	colon	3-adjuvant	1ère ligne	Colon Cancer (High-risk Stage III; pT4N1 or pT1 to 4 N2)	-	Experimental: Arm A mFOLFIRINOX Folfox Protocol + Irinotecan Active Comparator: Arm B mFOLFOX 6 Folfox Protocol	Lorient CH/Saint Grégoire CHP/St Malo Clinique de la Côte d'Emeraude/St Briec CARIO-HPCA/St Briec CH/St Malo CH/
CL295005002TASCO 1 CL2-95005-002	2	colon rectum	-	-	cancer colo rectal	-	Drug: Trifluridine/tipiracil hydrochloride (S 95005) Drug: Capecitabine Drug: Bevacizumab	ICO NANTES/ICO ANGERS/
CANALIMRT01 CANAL-IMRT-01	2	colon rectum	-	-	cancer colo rectal	-	Drug: 5Fluorouracile and Mitomycin-C Radiation: Simultaneously integrated boost of intensity modulated radiation therapy (SIB-IMRT) by tomotherapy SIB-IMRT schedule of 61.2 Gy/1.7 Gy to the primary tumor, 57.60 Gy / 1.6 Gy to involved nodes, and 54 / 1.5 Gy to elective pelvic lymph nodes.	ICO NANTES/
NEXT-REGIRI NCT03829462 PROICM 2018-01 NEX	3	Colon -rectum	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et +	Cancer colo-rectal	-	Drug: Regorafenib Drug: Irinotecan	Rennes CHU (CIC)/
AAS-Lynch P130937	3	colon, rectum	4-maintenance	0	Chimio-prévention par aspirine sur l'apparition ou la récurrence des adénomes colorectaux (Syndrome de Lynch)	-	Active Comparator: Aspirin300 Acetylsalicylic acid 300 mg tablet by mouth, daily dose during 4 years Placebo Comparator: Placebo300 Placebo (like Acetylsalicylic acid 300 mg) tablet by mouth, daily dose during 4 years Active Comparator: Aspirin100 Acetylsalicylic acid 100 mg tablet by mouth, daily dose during 4 years Placebo Comparator: Placebo100 Placebo (like Acetylsalicylic acid 100 mg) tablet by mouth, daily dose during 4 years	Rennes CEM/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

MODUL MO29112 2014-001017-61	2	colon, rectum	4-maintenance 5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Cancer colorectal métastatique non résécable	-	Experimental: Induction Treatment Phase Experimental: Cohort 1 (Maintenance Phase[MP]):5-FU/LV,cetuximab,vemurafenib Experimental: Cohort 2 (MP):5-FU/LV or capecitabine,bevacizumab,atezolizumab Experimental: Cohort 3 (MP): capecitabine,trastuzumab,pertuzumab Experimental: Cohort 4 (MP): Experimental arm Cobimetinib,atezolizumab Active Comparator: Control (MP): 5-FU/LV or capecitabin, bevacizumab Experimental: BRAFmut Early Progression (EP): 5-FU/LV,cetuximab,vemurafenib Experimental: BRAFmut EP: 5-FU/LV or capecitabine,bevacizumab,atezolizumab	Brest CHU (URC)/
OSCAR PRODIGE 49 PRODIGE49	3	colon, rectum	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	cancers colorectaux avec métastases hépatiques	-	Experimental: Experimental arm with oxaliplatin intra-arterial Panitumumab or Bevacizumab Oxaliplatin intra-arterially Folinic Acid intravenously 5Fu Active Comparator: Reference arm with oxaliplatin intravenous Panitumumab or Bevacizumab, Oxaliplatin intravenously Folinic Acid intravenously 5Fu	Lorient CH/Rennes CEM/Saint Grégoire CHP/
PANIRINOX UCGI28 PANIRINOX 2016-001490-33	2	colon, rectum	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne (exclu oxaliplatin en adjuvant)	Cancer colorectal métastatique (K-RAS, N- RAS, B-RAF)	K-Ras (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146), N-Ras (codons 12, 13, 59, 61) and B-Raf (codon 600) wild-type	Experimental group A : Panitumumab, oxaliplatin, folinic acid, 5fluoruracil, irinotecan Active Comparator group B : Panitumumab, oxaliplatin, folinic acid, 5fluoruracil	St Brieuc CARIO- HPCA/
PRODIGE54 SAMCO FFCD 1603	2	colon, rectum	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	MSI Colorectal Metastatique, non résécable	RAS and BRAF mutation a faire statut MSI Patient failure of chemotherapy containing fluoropyrimidine (capecitabine or 5FU) +/- irinotecan +/- oxaliplatin with or without cetuximab, bevacizumab and panitumumab	Active Comparator: Arm A Chemotherapy (standard treatment) FOLFOX or FOLFIRI +/- targeted therapy Interventions: Drug: FOLFOX regimen Drug: FOLFIRI Protocol Drug: Panitumumab Drug: Cetuximab Drug: Bevacizumab Drug: Aflibercept Experimental: Arm B - Immunotherapy (experimental arm) Avelumab Intervention: Drug: Avelumab	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/Saint Grégoire CHP/St Brieuc CARIO- HPCA/Quimper CH/St Malo CH/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PACHA-01 2014-005110-32 2014/2187	2, 3	colon, rectum, foie métastases	3-adjuvant 5-localement avancé ou métastatique	-	Métastases hépatiques d'un cancer colorectal	Traitement intra- artériel des métastases hépatiques de cancer colorectal	Active Comparator: Adjuvant systemic chemotherapy with mFOLFOX6 Experimental: Adjuvant HAI oxaliplatin and systemic LV5FU2	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/ICO NANTES/ICO ANGERS/CHU NANTES/
SULTAN UCGI 30 - PRODIGE 53	2	colon, rectum, foie métastases	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	Cancer colorectal avancé, métastatique hépatique uniquement, non résécable	Métastase du foie traité par HAI	Experimental: HAI oxaliplatin combined with I.V. FOLFIRI + target therapy Active Comparator: conventional systemic CT alone	Lorient CH/Rennes CEM/Saint Grégoire CHP/
REGOMUNE NCT03475953 IB 2017-01 2016-005175-27	2-3	Colorectal Cancer Not MSH-H or MMR-deficient GIST Oesophageal or Gastric Carcinoma Biliary Tract Cancer Hepatocellular Carcinoma Soft-tissue Sarcoma Thyroid	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	0	Colorectal Cancer Not MSH-H or MMR-deficient GIST Oesophageal or Gastric Carcinoma Biliary Tract Cancer Hepatocellular Carcinoma Soft-tissue Sarcoma Thyroid Cancer Gastro-enteropancreatic Neuroendocrine Tumor	Cohort A: Colorectal cancer not MSI-H or MMR-deficient Cohort B: GIST Cohort C: Oesophageal or gastric carcinoma Cohort D: Biliary tract cancer, hepatocellular carcinoma Cohort E: Soft- tissue sarcoma (STS) Cohort F:	Drug: Phase 1 : Regorafenib Drug: Phase 1 : Avelumab Drug: Phase 2 : Regorafenib Drug: Phase 2 : Avelumab	
PRODIGE31 REMINET	2, 3	duodenum, pancréas	4-maintenance	0	Tumeur neuroendocrine du duodenum et du pancréas	-	lanreotide vs placebo	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/
MK-3475- 859/KEYNOTE-859 KEYNOTE-859 3475-859 2018-001757-27 MK-3475-859	3	estomac JOG	0- inopérable 5- localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Adénocarcinome estomac ou JOG	HER -	Drug: Pembrolizumab Drug: Cisplatin Drug: 5-fluorouracil Drug: oxaliplatin Drug: capecitabine Drug: Placebo for Pembrolizumab	Brest CHU (CIC)/
Ilustro 8951-CL-0103	2	Estomac JOG	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	1ère ligne 3ème ligne et +	JOG estomac	expression CLDN18.2 HER -	Experimental: zolbetuximab (Cohort 1A and Cohort 1B) Experimental: mFOLFOX6 plus zolbetuximab (Cohort 2)	Brest CHU (URC)/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

SPOTLIGHT-ESTOMAC 8951-CL-0301 2017-002567-17	3	estomac JOG	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	adénocarcinome	CLAUDIN (CLDN)18.2-POSITIVE HER2-NEGATIVE	Drug: zolbetuximab Drug: placebo Drug: oxaliplatine Drug: leucovorin Drug: fluorouracil	Brest CHU (URC)/Rennes CEM/ICO ANGERS/
CYCLIGIST IB 2013-01	2	estomac, intestin	6- refractaire advanced	> = 3ième ligne	Gastro Intestinal Tumor (GIST)	-	Drug: PD-0332991 will be administrated orally, formulated as gelatin capsules of 100 mg and 25 mg respectively	ICO NANTES/
BEVANEC 69HCL14_0442 - Prodige 41	2	estomac, intestin, pancréas	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	NEUROENDOCRINE CARCINOMA Poorly Differentiated of an Unknown or Gastroentero-pancreatic Primary Cancer	après echec platine, etoposide	Experimental: Folfiri-bevacizumab Patient treated with a combination Folfiri-bevacizumab. Treatment every 2 weeks (D1 = D15) Active Comparator: Folfiri Patient treated with Folfiri only. Treatment every 2 weeks (D1 = D15)	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/
GILEAD GS-US-296-1080 2015-001526-42 GS-US-296	3	estomac, JOG	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Adénocarcinome avancé de l'estomac et la JOG	-	Experimental: Andecaliximab Placebo Comparator: Placebo	Brest CHU (URC)/
I4T-MC-JVDB	2	estomac, JOG	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	AdénoCarcinome JOG ou gastrique métastatique ou localement avancé	-	Ramucirumab IV 4 doses différentes testées	Brest CHU (URC)/
SOCRATE Prodige 55	2	estomac, JOG	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne (pas de taxanes)	Adénocarcinome	-	Bras A (bras expérimental) : Ramucirumab (J1=J28) Bras B (bras contrôle) : Ramucirumab plus Paclitaxel (J1=J28)	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/Vannes CHBA/St Briec CARIO- HPCA/Morlaix CH/St Malo CH/
FIGHT FPA144-004 NCT03694522	3	Estomac/CÉso phage	5- avancé ou métastatique	2ème ligne et +	un cancer de la jonction gastrique et gastro-oesophagienne	amplification du gène FGFR2	Drug: bemarituzumab (FPA144) Drug: Placebo Drug: mFOLFOX6	Brest CHU (URC)/
HIMALAYA D419CC00002	3	foie	1- non opérable 5- avancé	1ière ligne	Carcinome hépatocellulaire non opérable (HCC)	-	Drug: Durvalumab Drug: Tremelimumab (Regimen 1) Drug: Tremelimumab (Regimen 2) Drug: Sorafenib Drug: Durvalumab (Regimen 1) Drug: Durvalumab (Regimen 2)	CHU NANTES/
CA209-9DX	3	foie	3-adjuvant 4-maintenance	adjuvant	Carcinome hépatocellulaire	-	Study Type : Interventional (Clinical Trial) Estimated Enrollment : 530 participants Allocation: Randomized Intervention Model: Parallel Assignment Masking: Quadruple (Participant, Care Provider, Investigator, Outcomes Assessor) Primary Purpose: Treatment	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PREMETHEP PREMETHEP-CHC NCT02847468	NA	foie	5-localement avancé ou métastatique	NA	Carcinome hépatocellulaire	-	FDG Positron Emission Tomography FCH Positron Emission Tomography	Rennes CEM/
YO40245 IMbrave150 MBRAVE	3	Foie	5-localement avancé/métastatique	1ère ligne immunothérapie	Carcinome hépatique	-	Drug: Atezolizumab Drug: Bevacizumab Drug: Sorafenib	CHU NANTES/
AG120-C-005 ClarIDHy	3	foie, voies biliaires	5-localement avancé ou métastatique	2ème, 3ème ligne (dont 5FU ou GMZ)	Cholangiocarcinome avancé non résécable ou métastatique	IDH1	AG-120 : 500 mg PO x 1/jour en continu Placebo : PO x 1/jour en continu puis AG-120 à la progression	Rennes CEM/
IMADGIST-GIST IMADGIST 2013-001372-37	3a	GIST	4-maintenance	-	GIST	Gastrointestinal Stromal Tumors Resected Gastrointestinal Stromal Tumors Non-metastatic High Risk of Recurrence	Bras 1 : Poursuite Imatinib 300/400 mg/j PO jusqu'à progression □ 800 mg/j PO Bras 2 : Arrêt Imatinib jusqu'à progression □ 400 mg/j PO jusqu'à progression □ 800 mg/j PO	
BALLAD Prodiges 33 Prodige33	3	intestin grêle	3-adjuvant	-	adénocarcinome	-	Drug: observation alone Drug: LV5FU2 Drug: FOLFOX	Lorient CH/
BGB-A317-302	3	oesophage	0-inopérable 5- localement avancé ou métastatique	2ème ligne	Cancer épidermoïde de l'oesophage	-	Drug: BGB-A317 Drug: Paclitaxel, or Docetaxel, or Irinotecan	Brest CHU (URC)/
CRUCIAL EORTC-1714 2018-000053-53 (EudraCT Number) NCT03437200	2	oesophage	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et +	Œsophage	-	Drug: Nivolumab Drug: Ipilimumab Other: Chemoradiation	Brest Clinique du grand large/
PRODIGE32 ESOSTRATE	2, 3	œsophage	2-chirurgie	-	Cancer de l'oesophage opérable	-	Chirurgie systématique VS surveillance + chirurgie de recours	Saint Grégoire CHP/
PRODIGE 62 OESIRI	2	oesophage	5- localement avancé, métastatique 6- récursive, réfractaire	2ème ligne	Carcinome épidermoïde de l'oesophage	-	Drug: Onivyde Drug: Paclitaxel	Lorient CH/St Malo CH/
NEONIPIGA NEONIPIGA - D18-02 NCT04006262	2	œsophage estomac	1-Néoadjuvant 3- Adjuvant	1ère ligne	cancer oesogastrique	localisatio dMMR et/ou MSI	Drug: Nivolumab 10 MG/ML Drug: Ipilimumab 200 MG in 40 ML Injection	CHU NANTES/
PROTECT-1402 protect-oesophage	2	œsophage, JOG	1-néoadjuvant	1ère ligne	Resectable Esophageal and Junctional Cancer	-	Drug: FOLFOX Drug: CarboP-pacliT	Rennes CEM/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

CA209-577 2015-005556-10 CheckMate 577	3	œsophage, JOG	3-Adjuvant	3ème ligne et plus	Stage I/III carcinoma of the esophagus or gastroesophageal junction	-	Parallel Assignment Nivolumab vs Placebo	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/
GASTFOX Prodigé 51 Prodigé-51	3	œsophage, JOG	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Adénocarcinome oesogastrique	her2 négatif	Bras A (bras de référence): FOLFOX Une cure tous les 14 jours Bras B (bras expérimental) : TFOX Une cure tous les 14 jours	Saint Grégoire CHP/St Malo CH/
Panova-3 EF-27 PANOVA	3	pancréas	0-inopérable 5-localement avancé ou métastatique	-	cancer du pancréas avancé métastatique	-	Experimental: NovoTTF-100L(P) Patients receive TTFIELDS using the NovoTTF-100L(P) System together with gemcitabine and nab-Paclitaxel Active Comparator: Best Standard of Care Patients receive best standard of care with gemcitabine and nab-Paclitaxel	Lorient CH/St Briec CARIO- HPCA/ICO ANGERS/
PANACHE01 PRODIGE48 2014/210/HP	2	pancréas	1-néoadjuvant	-	Adenocarcinome pancréatique résécable	-	Experimental: FOLFOX neoadjuvant chemotherapy Active Comparator: standard adjuvant chemotherapy Experimental: FOLFIRINOX neoadjuvant chemotherapy Active Comparator: standard adjuvant chemotherapy	Rennes CEM/
PANDAS-PRODIGE 44 PANDA PRODIGE 44 Prodigé44 2014-005681-29	2	pancréas	1-néoadjuvant	1ère ligne	Pancreatic Carcinoma	borderline resecable	Drug: mFolfirinox oxaliplatin folinic acid irinotecan 5FU oxaliplatin •Radiation: Chemoradiotherapy conformational external irradiation (50.4 Gy) + capecitabine •Procedure: surgery 1 to 4 weeks after neoadjuvant treatment according to tumour response •Drug: Adjuvant chemotherapy Gemcitabine or modified LV5FU (folinic acid+bolus fluorouracil+ infusional fluorouracil : supprimée remplacée par	Rennes CEM/Saint Grégoire CHP/
PRODIGE29 NEOPAN	3	pancréas	1-néoadjuvant	Toutes lignes	Carcinome pancréatique localement avancé	-	Gemcitabine vs Folfirinox	St Briec CARIO- HPCA/St Malo CH/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PANC003 panc CPI 613NCT03504423	3	pancréas	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	ADK pancréas	0	Drug: CPI613, mFolfinrox Drug: Folfinrox	Brest CHU (URC)/
POLO D081FC00001	3	pancréas	5-localement avancé ou métastatique	maintenance après platine sans progression	Cancer pancréatique métastatique naïf d'anti PARP	mutation gBRCA	Experimental: Olaparib Olaparib tablets po. 300 mg twice daily Placebo Comparator: Placebo Placebo tablets twice daily	Brest CHU (URC)/
GRASPANC Trybeca-1 GRASPANC 2018-01	3	pancréas	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	adénocarcinome ductal pancréatique	Ne doit pas avoir échoué à plus de 1 lignes pour le cancer avancé et présentant une maladie mesurable	Study Type : Interventional (Clinical Trial) Estimated Enrollment : 500 participants Allocation: Randomized Intervention Model: Parallel Assignment Masking: None (Open Label) Primary Purpose: Treatment	Brest CHU (URC)/
GRECCAR6 P 110125, AOM 11304	3	rectum	1-néoadjuvant 2-chirurgie	toutes lignes	Cancer rectal	-	Temps entre radiochimiothérapie et chirurgie (7 vs 11 semaines)	Rennes CHU (CIC)/
KEYNOTE-966 NCT04003636 3475-966 2019-000944-82 MK-3475-966	3	Voies biliaires	0-inopérable 5-avancé ou métastatique	1ère ligne	Carcinome des voies biliaires	-	Drug: Pembrolizumab Drug: Gemcitabine Drug: Cisplatine Drug: Placebo	Rennes CEM/
IMMUNO-BIL D18-1 NCT03704480 PRODIGE 57	2	Voies biliaires	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	Voies biliaires	avec avoir reçu platine	Drug: Durvalumab Drug: Tremelimumab Drug: Paclitaxel	Brest CHU (URC)/
ONCOGERIATRIE PRODIGE34 ADAGE	3	colon	3-adjvant	toutes lignes	AdénoCarcinome colique stade III Oncogériatrie	Oncogériatrie	bi-chimiothérapie adjvante vs mono-chimiothérapie adjvante	Rennes CHU (CIC)/Rennes CHU (CIC)/Lorient CH/Rennes CEM/Brest Clinique Pasteur/Saint Grégoire CHP/St Brieuc CARIO- HPCA/Morlaix CH/St Malo CH/
ONCOGERIATRIE PRODIGE25 FOLFA FFCD1101	2	colon, rectum	5-localement avancé ou métastatique	1ère ligne	Non-resectable Metastatic Colorectal Cancers	older patients	Drug: aflibercept Other Name: zaltrap Drug: LV5FU2	Vannes CHBA/Lorient CH/Rennes CEM/St Brieuc CARIO- HPCA/ICO NANTES/ICO ANGERS/
PHASE PRECOCE CL1-95005-001 CL195005-Colorectal CL195005	1	colon, rectum	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne et plus	cancer colorectal métastatique	-	Experimental: S 95005 + oxaliplatine (+/- bevacizumab or nivolumab) Interventions: Drug: Trifluridine/tipiracil hydrochloride (S 95005) Drug: Oxaliplatine Drug: Bevacizumab Drug: Nivolumab	Rennes CEM/
PHASE PRECOCE MEDITREME MEDI- TREME-COLON	1,2	colonrectum	5-métastatique	1ère ligne	Colorectal	mutation positive du gène Kras	Drug: Durvalumab, Tremelimumab and ,FOLFOX	St Brieuc CARIO- HPCA/CHU NANTES/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PHASE PRECOCE PIPOX 01 ICO-N-2016-03	1, 2	estomac, intestin grêle, colon, rectum	-	2ème ligne	Cancer digestif (estomac, intestin grêle, colon, rectum) avec métastases péritonéales non résécables Traitement des métastases par chimiothérapie intrapéritoneal.	-	Experimental: Oxaliplatin The experimental drugs used in this protocol are Oxaliplatin, 5-Fluorouracil and L-Folinic acid. All are used as part of their marketing authorization, with the exception of Oxaliplatin as regards its mode of administration specific to the CIPPA procedure (injection and nebulisation in intraperitoneal).	ICO NANTES/
PHASE PRECOCE LIP-RE-1	1	foie	1-néoadjuvant	2ème ligne	Carcinome hépatocellulaire avancé	si L1 sorafenib	188Re-SSS-lipiodol	Rennes CEM/
PHASE PRECOCE NBTR3-103 Nanobiotix3 Nanobiotix 3 NBTR3103	1, 2	foie	3-adjuvant	-	Foie hépatocarcinome et métastases hépatiques	-	Radiation: NBTR3, IL or IA injection + SBRT	ICO NANTES/
PHASE PRECOCE H3B-6527 H3B-6527- G000-101 2016-001915-19 (EudraCT Number) NCT02834780	1	Foie	5- localement avancé	1ère ligne si TT standard contre indiqué 2ème ligne et +	Carcinome hépatocellulaire ou cholangiocarcinome intrahépatique	-	Drug: H3B-6527	Rennes CEM/
PHASE PRECOCE REGIRI UC-0110/1807 NCT03722108 2018-002374-46	1-2	Jonction gastro- oesophagienn e Estomac	5-localement avancé ou métastatique	2ème ligne	Adenocarcinoma of the Stomach Adenocarcinoma of the Gastroesophageal Junction	-	Combination Product: Regorafenib and Irinotecan Drug: Irinotecan	ICO NANTES/ICO ANGERS/
PHASE PRECOCE OSAGE N/2014/68	1, 2	œsophage	-	radiochimiothérapie	Cancer de l'œsophage patient de plus de 75 ans	-	Experimental: Phase I for chemotherapy 3 levels: 50%, 75% and 100% of the standard Dutch dose (carboplatin AUC 2 and paclitaxel 50 mg/m2) for radiotherapy 3 levels: 41.4 Gy/1.8 Gy/f; 45 Gy/1.8 Gy/f; 50.4 Gy/1.8 Gy/f basel level being : 41.4 Gy and 50% of standard CT doses The phase I is conducted with increasing doses of each component with 9 levels. Drug: Carboplatin	ICO NANTES/ICO ANGERS/
PHASE PRECOCE 2013A201306DESIR 14069 ICO	1	rectum	-	-	cancer du rectum	-	NC	ICO NANTES/ICO ANGERS/

LES FICHES RECAPITULATIVES DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE

Essais ouverts en Bretagne - HEPATO-DIGESTIF - PHASE I A III

Pour plus d'informations : <http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr> - contact: ingrid.felten-vinot@chu-rennes.fr

PHASE PRECOCE COMBO D5330C00004	1,1b,	Tête et cou Estomac JOG Poumon Sein tout organe	5- localement avancé et métastatique	ligne variable selon les organes	B3 : cancer du sein HER2 négatif avec mutation BRCA1 ou BRCA2 somatique ou germinale, en 2ème et 3ème ligne : Fermé B4 : cancer du sein triple négatif sans mutation BRCA1 ou BRCA2	Selon les organes BRCA HER2- ATM Pro/Def..	Drug: Administration of AZD6738 in combination with olaparib Drug: Administration of AZD6738 in combination with MEDI4736	ICO NANTES/
PHASE PRECOCE TG4001.12 NCT03260023	1b-2	Tête et cou Pharynx Col de l'utérus Vulve Vagin Pénis Canal anal	5-localement avancé ou métastatique 6-récidive, réfractaire	1ère à 3ème ligne	Kc épidermoïde oropharynx (après platines) Col de l'utérus (après platines), Vulve, Vagin, Pénis Canal anal HPV-16 positif	-	Biological: TG4001 Drug: Avelumab	ICO NANTES/ICO ANGERS/